

LISTA DE MAMÍFEROS

Alta Floresta

O presente trabalho, elaborado e compilado por José Augusto Couto Rosa de Oliveira, visa listar e documentar as mais diversas espécies de mamíferos encontradas na região de Alta Floresta - MT. Tendo sido elaborada com material bibliográfico, além de terem sido colocadas espécies cujas observações foram pessoalmente relatadas pelo autor e/ou por terceiros, esta lista é passível de correções e discussões.

As letras colocadas entre parênteses na frente de cada espécie listada têm os seguintes significados:

(e) - esperada - Espécie não observada, porém com grande probabilidade de ocorrência devido à sua distribuição geográfica

(r) - Espécie não observada diretamente, porém alta probabilidade, através da distribuição geográfica, de ocorrer na região; relatada por várias pessoas locais

(o) - Observada - Espécie observada diretamente

ORDEM MARSUPIALIA

FAMÍLIA DIDELPHIDAE

- *Caluromys lanatus*: Mucura / Common Woolly Opossum (e)

- *Caluromys philander*: Mucura Titica / Bare-tailed Woolly Opossum (e)

Pequenos gambás de pelagem lanosa e densa. As duas sp. diferem-se principalmente pela calda coberta pelos até a metade em *C. lanatus*, enquanto *C. philander* apresenta calda nua em praticamente toda a sua extensão.

Alta Floresta encontra-se exatamente na zona de contato das regiões abrangidas pelas duas sp., sendo portanto constituinte da estreita faixa onde ocorre em mesma região.

- *Didelphis marsupialis*: Gambá Preto / Common Opossum (o)

- *Didelphis albiventris*: Gambá Branco / White-eared Opossum (o)

Gambás comuns, facilmente distintos pela grande presença de pêlos brancos e máscara negra em *D. Albiventris*, enquanto em *D. marsupialis* é marrom ou cinza escuro e uniforme.

- *Philander opossum*: Cuíca de Quatro Olhos / Common Gray Four-eyed Opossum (e)

Gambás de pêlos curtos com máscaras negras em torno dos olhos e manchas brancas sobre e abaixo dos mesmos. Cauda com pêlo somente na base e dorso cinza escuro.

- *Metachirus nudicaudatus*: Cuíca, Jupati / Four-eyed Opossum (r)

Espécie semelhante a anterior, porém com dorso marrom com orelhas mais curtas. Cauda marrom ou cinza uniforme e com curtíssimo anel de pêlo na base.

- *Micoureus constantinae*: Catita / Pale-bellied Woolly Mouse Opossum (e)

Pequeno marsupial que muito se assemelha, externamente com grandes ratos de árvores. Gênero recentemente redividido e ainda indefinido quanto à distribuição geográfica de cada sp.

- *Marmosa murina*: Murine mouse opossum (e)

Animal semelhante ao anterior, porém com pelagem mais fina e não lanosa

ORDEM EDENTATA**FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE**

- *Myrmecophaga tridactyla*: Tamanduá Bandeira / Giant Anteater (o)

O maior dos tamanduás, facilmente identificável pela longa cauda com grossa e densa pelagem. Animal relativamente raro na região por dar preferência a campo limpo ou pastagens.

- *Tamandua tetradactyla*: Tamanduá Mirim / Southern Tamandua, Lesser Anteater (o)

O mais comum tamanduá da região, menor que o anterior e de hábito arborícola (cauda prênsil), coloração bem distinta, costas negras e membros, cabeça e pescoço em caramelo.

- *Cyclopes didactylus*: Tamanduáí / Silky (Pygmy) Anteater (r)

O menor dos tamanduás (200g em média), é raro e de difícil visualização devido a seus hábitos arborícolas de copa e reduzido tamanho. A pelagem é de cor branca ou creme brilhante.

FAMÍLIA BRADYPODIDAE (MEGALONICHIDAE)

- *Bradypus variegatus*: Preguiça de Bentinho / Brown-throated Three-toed Sloth (o)

Preguiça de três dedos mais comum no interior do Brasil de coloração das costas variando de marrom claro ao branco sujo e hábito arborícola de copa (se alimenta de folhas) raramente desce ao chão e por isso é também de difícil visualização.

- *Choloepus didactylus*: Preguiça Real (de Dois Dedos) / Southern Two-toed Sloth (o)

Semelhante a anterior, porém notadamente maior e com apenas duas grandes garras.

FAMÍLIA DASYPODIDAE

- *Euphractus sexcinctus*: Tatu Peba (Peludo) / Yellow Armadillo (e)

Dorso e cabeça cobertos por armadura marrom amarelada ou marrom avermelhada clara. Presença de longos pêlos esbranquiçados sobre o casco. Orelhas curtas

Região limite para a espécie ao Norte do interior do Brasil por forragear mais em campos e cerrados.

- *Cabassous unicinctus*: Tatu Bola (de Rabo Mole), Cabassu / Southern Naked-tailed Armadillo (e)

Tatu de pequeno porte com cabeça e dorso cobertos por carapaça óssea. Cauda desprovida de placas. Apresenta os dois pares de membros bastante poderosos e com grandes garras.

- *Priodontes maximus*: Tatu Canastra / Giant Armadillo (r)

O maior dos tatus, podendo chegar a 30kg, com grandes unhas nos membros dianteiros.

É, às vezes, confundido com *Dasypus Kappleri* que é menor e possui grandes orelhas arredondadas.

- *Dasypus novemcinctus*: Tatu Galinha / Nine-banded Armadillo (o)

Dorso uniformemente cinza escuro, grandes orelhas arredondadas e de pequeno porte com 8 - 10 bandas móveis na região centro-dorsal. A carapaça não se funde à cabeça.

- *Dasypus Kappleri*: Tatu 15 Kilos (Galinhão) / Great long-nosed armadillo (r)

Semelhante externamente à *D. novemcinctus*, porém muito maior. Com 7 - 9 bandas móveis no meio do corpo.

Difere de *P. maximus* pelas longas orelhas arredondadas e membros muito mais delicados.

Este é, provavelmente, o ponto mais extremo ao SO onde esta sp. é encontrada.

- *Dasypus septemcinctus*: - Tatuí / Seven-banded Armadillo (e)

Bastante semelhante à *D. novemcinctus*, mas bem menor (1,5kg). Apresenta de 6 -7 bandas móveis.

ORDEM CHIROPTERA

A lista de morcegos foi adicionada à este estudo a partir das observações de Ana Carolina Moreira Martins -, Universidade de Brasília (UNB), em setembro de 2013.

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE

- *Artibeus cinereus*: Gervais's Fruit-eating Bat (o)
- *Artibeus lituratus*: Morcego-de-listras-brancas-na-cabeça / Great fruit-eating bats (o)
- *Artibeus obscurus*: Dark fruit-eating bat (o)
- *Artibeus planirostris*: Flat-faced fruit-eating bat (o)
- *Carollia brevicauda*: Silky short-tailed bat (o)
- *Carollia perspicillata*: Seba's short-tailed bat (o)
- *Chiroderma trinitatum*: Little big-eyed bat (o)
- *Choeroniscus minor*: Lesser long-tongued bat (o)
- *Desmodus rotundus*: Morcego-vampiro / Common vampire bat (o)
- *Glossophaga soricina*: Morcego-beija-flor / Pallas's long-tongued bat (o)
- *Glyphonycteris sylvestris*: Tricolored big-eared bat (o)
- *Lampronycteris brachyotis*: Yellow-throated big-eared bat (o)
- *Lonchophylla thomasi*: Thomas's nectar bat (o)
- *Mesophylla macconnelli*: MacConnell's bat (o)
- *Phylloderma stenops*: Pale-faced bat (o)
- *Phyllostomus elongatus*: Lesser spear-nosed bat (o)
- *Platyrrhinus incarum*: (o)
- *Rhinophylla fischeriae*: Fischer's little fruit bat (o)
- *Rhinophylla pumilio*: Dwarf little fruit bat (o)
- *Sturnira tildae*: Tilda's yellow-shouldered bat (o)
- *Trachops cirrhosus*: Fringe-lipped bat (o)
- *Uroderma bilobatum*: Tent-making bat (o)
- *Vampyressa pusilla*: Southern little yellow-eared bat (o)
- *Vampyrodes caraccioli*: Great stripe-faced bat (o)

FAMÍLIA EMBALONURIDAE

- *Cormura brevirostris*: Morcego Asa de Saco Castanho / Chestnut sac-winged bat (o)
- *Diclidurus albus*: Northern ghost bat (o)
- *Peropteryx kappleri*: Greater dog-like bat (r)
- *Peropteryx macrotis*: Lesser dog-like bat (r)
- *Rhynchonycteris naso*: Brazilian long-nosed bat (o)

Corpo marrom acinzentado, duas linhas brancas onduladas no dorso. Apresenta pequenos tufo de pelos brancos no ante-braço (asa). Folha nasal alongada.

- *Saccopteryx bilineata*: Greater sac-winged bat (r)

Dorso mais escuro do que o anterior, mas também apresentando as duas linhas onduladas, um pouco mais discretas. Membrana da cauda mais longa do que as pernas.

- *Saccopteryx leptura*: Lesser sac-winged bat (r)

FAMÍLIA MOLOSSIDAE

- *Neoplatymops mattogrossensis*: Mato Grosso dog-faced bat (r)

FAMÍLIA THYROPTERIDAE

- *Thyroptera tricolor*: Spix's disk-winged bat (o)

ORDEM PRIMATAS

FAMÍLIA ATELIDAE

- *Alouatta seniculus*: Bugio Vermelho / Red Howler Monkey (o)

Macaco de médio a grande porte de pelagem avermelhada com a região do papo bem desenvolvida. Se alimenta basicamente de folhas e frutas e raramente desce das árvores. Tem cauda prênsl e é encontrado na margem sul do Rio Teles Pires.

Os bugios são conhecidos pelo barulho que fazem nos horários crepusculares.

- *Alouatta belzebul*: Guariba, Bugio / Red-handed Howler Monkey (o)

Um pouco menor do que o *A. seniculus* e de coloração escura, preto no corpo e com as extremidades avermelhadas. É bastante comum nos arredores do Cristalino Lodge.

Fato interessante é que estamos em um dos poucos lugares onde foi constatada a simpatria entre 2 sp de *Alouatta*.

- *Ateles marginatus*: Macaco Aranha de cara branca / White-whiskered Spider Monkey (o)

Sua principal característica é a longa cauda prênsl utilizada constantemente como 5º membro. De dorso negro e ventre mais claro (cinza-branco) é bastante comum na região do Cristalino Lodge. Sua principal característica é o rosto com pelagem branca nos indivíduos adultos da sp.

FAMÍLIA AOTIDAE

- *Aotus azarae*: Macaco da Noite, Gogó de Sola / Azara's night monkey (o)

Macaco de pequeno porte apresentando dorso de pelagem cinzenta ou marrom e bastante densa, ventre variando do bege ao laranja. Com rosto redondo e olhos grandes são os únicos macacos noturnos do Novo Mundo. Cauda não prênsl e com densa pelagem.

FAMÍLIA CALLITRICHIDAE

- *Mico argentatus*: Sauim, Sagui Branco / Silvery Marmoset (o)

Animal de pequeno porte, de dorso branco prateado, face rosada ou branca e olhos negros. Extremidades do corpo mais escuras variando em diferentes tonalidades de marrom. Cauda de coloração extremamente variável. Ventre pode ser amarelado.

Sp pertencente a um grande grupo extremamente variável tornando difícil e confusa a identificação, especialmente por não possuímos dados precisos sobre sua distribuição geográfica.

- *Mico emiliae*: Sagui, Sauim / Emilia's marmoset (e)

Sagui um pouco menor que o anterior, de coloração mais escura, olhos castanho claros e, como os anteriores, sem tufo nas orelhas. Cauda Preta.

De acordo com a distribuição geográfica desta espécie, é provável que exista na margem sul do rio Teles Pires, onde foram reportadas observações de uma sp menor e mais escura de sagui.

FAMÍLIA CEBIDAE

- *Sapajus apella*: Macaco Pregão / Brown Capuchin Monkey (o)

Dorso marrom (variável) com membros, cauda e cabeça negros normalmente.

Muito bem adaptados à presença humana.

FAMÍLIA PITHECIIDAE

- *Callicebus moloch*: Zogue-zogue, Japussá / Duky Titi Monkey (o)

Dorso marrom escuro ou avermelhado ou finamente rajado de cinza. Cauda não prênsl com pelagem muito densa (cinza marrom ou preta) e ponta clara. Porção ventral e queixo vermelho ou ruivo, de pequeno/médio porte. Identificação específica difícil. Como em *Aotus*, utilizamos a distribuição geográfica proposta por Emmons.

FAMÍLIA PITHECIIDAE - CONT.

- *Chiropotes albinasus*: Coxiu de Nariz Vermelho / White-nosed Bearded Saki Monkey (o)

Macaco médio bastante comum nos arredores do Cristalino. De pelagem preta e densa apresenta o nariz como única parte de diferente coloração (variando do branco rosado ao vermelho). A cauda é espessa e não prênsl.

ORDEM CARNIVORA

FAMÍLIA CANIDAE

- *Atelocynus microtis*: Cachorro do Mato / Short-eared Dog (o)

Animal pouco abundante na região, de dorso cinza escuro, pelagem curta, densa e oleosa. Orelhas curtas e arredondadas porém salientes sobre a cabeça de cor marrom claro contrastando com a cabeça negra. Cauda preta longa e espessa (principal meio de identificação rápida, outra forma é a coloração uniforme), membros também pretos.

- *Cerdocyon thous*: Lobinho, Graxaim, Raposinha / Crab-eating Fox (o)

Ligeiramente menor que A microtis e com orelhas maiores e coloração cinza claro com uma faixa mais escura ao longo do dorso. Cauda curta em relação ao tamanho do corpo.

- *Speothos venaticus*: Cachorro (do Mato) Vinagre / Bush Dog (o)

Pescoço e ombros marrom ou castanho claro. Orelhas curtas. Região posterior mais escura. Pode ser confundido com A microtis e E. barbara. Animal bastante raro.

FAMÍLIA PROCIONIDAE

- *Procyon cancrivorus*: Mão Pelada / Crab-eating Raccoon (r)

Facilmente identificável pela cauda anelada, espessa e relativamente curta e pela coloração cinza. Focinho curto e máscara preta nos olhos.

Confundível com N.nasua que possui cauda e focinho mais longos e coloração mais para o marrom.

- *Nasua nasua*: Quati / South American Coati (r)

Animal bastante comum em praticamente todo o território brasileiro e extremamente bem adaptado à presença humana. Sua coloração é muito variável, indo do preto ao mel porém inconfundível devido à longa cauda anelada e o focinho também longo, além de estarem normalmente em grandes bandos.

- *Potos flavus*: Jupará, Carcaju / Kinkajou (o)

Animal arborícola noturno (grandes olhos frontais) de coloração avermelha e longa cauda prênsl. A cabeça é arredondada com focinho curto e fino e ligeiramente mais escura que o corpo. Região ventral notadamente contrastante com o dorso (amarelo-alaranjado).

FAMÍLIA MUSTELIDAE

- *Galictis vittata*: Furão / Greater grison (r)

Animal solitário e bastante agressivo. De dorso branco ou cinza claro e ventre mais partes baixas preto. A cauda é curta e volumosa, da mesma cor do dorso. Corpo alongado.

- *Eira barbara*: Irara / Tayra (o)

De coloração variável, mas com pelagem densa variando do marrom ao preto, podendo ou não apresentar cabeça e peito mais claros (tendendo para o mel). Cauda longa e peluda.

Animais predominantemente noturnos, podendo ser ativos também durante o dia. São onívoros, mas bons predadores, podendo se tornar agressivos em certas ocasiões.

- *Lontra longicaudis*: Lontra / Neotropical Otter (o)

Dorso inteiramente marrom uniforme, corpo alongado e flexível e pelagem curta e densa. Região abaixo do queixo, peito e barriga branco puro ou amarelado. As orelhas são muito pequenas. Cauda longa e robusta (principalmente na base) com pelos curtos.

FAMÍLIA MUSTELIDAE - CONT.

• *Pteronura brasiliensis*: Ariranha / Giant Otter (o)

Bastante semelhante a *L. longicaudis* exceto por ser bem maior e apresentar manchas brancas e marrom na região antero-ventral. Diferentemente da anterior, a cauda de *P. brasiliensis* é fortemente achatada dorso-ventralmente.

FAMÍLIA FELIDAE

Leopardus pardalis: Jaguaritica / Ocelot (o)

Gato de porte médio (6-12 Kg), dorso pardo amarelado com pintas e linhas longitudinais pretas. Pescoço com densas listras pretas e pelo revesso. Cauda notavelmente menor do que a extensão do corpo com pintas e bandas pretas.

Leopardus wiedii: Gato Maracajá / Margay (o)

Animal bastante semelhante a *L. pardalis*, porém menor (3 – 9 Kg) e com cauda mais longa em relação ao corpo.

Puma yagouaroundi: Jaguarundi, Gato Morisco / Jaguarundi (o)

Gato de coloração uniforme, pardo-cinza, variando até preto ou avermelhado. Cabeça pequena assim como as orelhas arredondadas. Corpo de formato esguio com longa e também esguia cauda.

Puma concolor: Onça parda, Suçuarana / Puma (o)

Gato de grande porte (40 – 100 Kg) de coloração parda, podendo apresentar o dorso mais escuro ou uniforme. Cauda longa e com a extremidade preta. Esta sp foi fotografada em camera trap nas proximidades do Cristalino Lodge.

Panthera onca: Onça (Pintada ou Preta) / Jaguar (o)

O maior felino das Américas (90 – 150 Kg). Dorso amarelado com pintas e rosetas em todas as costas e membros. Cabeça muito grande com dentes longos e pontiagudos e orelhas pequenas e arredondadas.

Apresenta variações quanto à coloração e tamanho das pintas e ainda diferenças do tamanho e comprimento de corpo e membros onde cada uma destas variações morfológicas pode provavelmente constituir ssp.

Obs.: A Onça preta é desta mesma espécie, porém sendo geneticamente recessiva, chamada de melanismo.

ORDEM PERISSODACTYLA

FAMÍLIA TAPIRIDAE

Tapirus terrestris: Anta / South American tapir (o)

Corpo de coloração uniforme variando do marrom escuro ao preto (adultos). É o maior mamífero terrestre da América do Sul. Animal do grupo taxonômico do cavalo (membros com número de dedos ímpares), possui uma grande cabeça com um focinho longo e móvel em forma de tromba.

É essencialmente herbívoro (frutas e folhas) e está sempre próximo à água.

Filhotes são de cor marrom com listras brancas horizontais.

ORDEM ARTIODACTYLA**FAMÍLIA TAYASSUIDAE**

- *Pecari tajacu*: Cateto, Caititu / Collared Peccary (o)

De coloração escura (preto ou marrom) e com uma banda mais clara em torno do pescoço saindo à altura dos ombros. Cascos fendados (2 dedos). Crista de pelos longos Antero dorsal.

Pode ser confundido com o T. pecari porém é menor e anda em menores bandos.

- *Tayassu pecari*: Queixada / White-lipped Peccary (o)

Muito semelhante ao anterior, porém maior e sem o colar. Tem a mandíbula e queixo brancos ou amarelados e longos caninos.

Normalmente andam em grandes bandos (30 – 70 indivíduos) e batem os queixos para afiarem seus longos caninos.

FAMÍLIA CERVIDAE

- *Mazama americana*: Veado Mateiro / Red Brocket Deer (o)

Cervídeo de pequeno porte com chifres de pontas únicas, coloração avermelhada em todo o dorso e mais pálido no ventre. Somente os machos têm chifres. Região posterior mais alta que a anterior.

- *Mazama gouazoubira*: Cambuta, Veado Catingueiro / Gray brocket Deer (o)

Bastante semelhante ao anterior, porém de coloração cinza ou marrom com o dorso mais escuro e um pouco menor. Mais raro na região, talvez porque prefira ambientes abertos.

ORDEM RODENTIA**FAMÍLIA SCIURIDAE**

- *Sciurus spadiceus*: Caxinguelê, Esquilinho / Southern Amazonian Red Squirrel (e)

- *Sciurus aestuans*: Caxinguelê, Esquilinho / Brazilian squirrel (o)

Pequenos esquilos que vivem na mata mais fechada, em meio a cipós. Têm caudas longas e peludas, cabeças grandes em relação ao corpo.

De difícil identificação, pois se movimentam rapidamente por entre as árvores, galhos e cipós.

Devido à distribuição geográfica podemos afirmar que *S.aestuans* é mais abundante na região.

FAMÍLIA MURIDAE

- *Phipidomys sp* (e)

- *Oligoryzomys sp* (e)

- *Holochilus sciureus*: Amazonian marsh rat (e)

- *Oecomys sp* (e)

- *Rattus norvegicus*: Brown rat (e)

- *Nectomys sp* (e)

Esta família inclui a grande maioria dos ratos que conhecemos. São necessários mais estudos para o levantamento das sp presentes na região.

FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE

- *Coendou prehensilis*: Ouriço Caixeiro, Porco Espinho / Brazilian Porcupine (o)

Animal singular, com pelos em forma de espinhos sendo que estes são sua única forma de defesa. Espinhos tricolores, branco ou amarelado nas extremidades e escuros no centro. A coloração é geralmente marrom escura ou negra. Focinho de cor rosada. Tem cauda prênscil.

FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE

- *Hydrochaeris hydrochaeris*: Capivara / Capybara (o)

O maior roedor do mundo (até 60 Kg) de cor marrom uniforme com pelos grossos. Cabeça com focinho quadrado e pequenas orelhas. Os olhos são situados alto na cabeça.

Vivem em grandes grupos (5 – 40 indivíduos) sempre próximos à água havendo sempre um macho dominante que possui uma glândula odorífera sobre o focinho.

FAMÍLIA AGOUTIDAE

- *Agouti paca*: Paca / Lowland paca (o)

Roedor desprovido de cauda de coloração marrom com listras brancas longitudinais.

Animal noturno largamente caçado devido à sua saborosíssima carne.

FAMÍLIA DASYPROCTIDAE

- *Dasyprocta agouti*: Cotia de Lombo Vermelho / Red-rumped Agouti (o)

Roedor de porte médio (menor que o anterior) bastante comum em grande parte do Brasil. Pequena cotia de dorso posterior avermelhado que prefere locais de mata primária ou pouco perturbados.

- *Dasyprocta azarae*: Cotia Cinzenta / Azara's Agouti (o)

Pouco maior que a anterior e de coloração cinza. Dá preferência a ambientes mais abertos ou perturbados; bastante acostumada à presença humana.

Animal bastante comum nos arredores do Floresta Amazônica Hotel.

FAMÍLIA ECHIMYIDAE

- *Proechimys sp* (e)
- *Dactylopsax dactylinus*: Amazon bamboo rat (e)
- *Makalata didelphoides*: Brazilian spiny tree-rat (e)

Os ratos de espinho *Proechimys sp* são, provavelmente, os mamíferos mais numerosos da floresta, de pelagem de aparência espinhenta e que perdem parte da cauda quando atacados, fato que explica a existência de caudas curtas ou simplesmente ausente, de porte mediano.

P.dactylinus não seria encontrado aqui de acordo com a distribuição geográfica, porém já foram gravadas suas vocalizações durante a noite. Mais estudos se fazem necessários para o levantamento das sp presentes na região.

ORDEM LAGOMORPHA

FAMÍLIA LEPORIDAE

- *Sylvilagus brasiliensis*: Lebre, Tapiti / Tapiti, Brazilian Rabbit (o)

Pequeno coelho de pelagem cinzenta. É o único coelho nativo brasileiro.